

多発イボ CO₂ 治療同意書

顔・首・体に多発する小さなイボをCO₂レーザーでピンポイントに蒸散させる（削る）方法です。

治療範囲	顔・首・体の1部位（ハガキ2枚分の範囲）ごとの施術となります。 レーザー照射数は担当医師に一任していただきます。必ずしも全てが取りきれ るわけではありませんのでご理解・ご了承下さい。黒子・脂腺増殖症・麻酔薬を 使用する隆起した脂漏性角化症等は別途料金がかかります。 診察の合間に処置をさせていただきます。お時間に余裕をもってお越し下さい。
治療が受けられない方	1ヵ月以内に日焼けをした方・妊娠、授乳中の方・皮疹、皮膚炎ヘルペス発疹が でている方・自己免疫疾患の方・ペースメーカー、埋めこみ式除細動器、金属プ レート、金の糸、シリコンが埋め込まれている方・重度の心臓疾患を有する方・ 糖尿病など創傷治癒に問題がある方・ケロイド体質の方・麻酔アレルギーのある 方・抗凝固薬・抗血小板薬内服中の方。
ダウンタイム 治療後の経過	①レーザー照射後～1～2週間：小さなカサブタがたくさんできます。カサブタ は無理に剥がしたり、掻いたりしないようにして下さい。 ②1～2週間後～1年半：カサブタがとれたらピンク色の色調になります。（ま だ再生した皮膚が薄い状態）痂皮が剥がれてから、一時的に色味が濃くなるこ とがありますが、これは炎症後色素沈着といって、レーザーの照射により皮膚 に熱を加えたため起こる一過性の変化です。時間経過の中で徐々に消退して いきます。
写真	経過観察を目的にカルテ写真をお取りさせていただきます。
洗顔・入浴・メイク	治療後すぐに洗顔・入浴ができます。メイクは翌日から可能ですが、メイク時に 強く擦ったりしないように注意して下さい。
アフターケア	治療後3日間、1日1回炎症止めの軟膏を外用して下さい。治療した部位は過 敏な状態となりますので、紫外線に直接さらすと色素沈着を起こしやすくなり ます。SPF20以上の日焼け止めを使用して下さい。治療後は保湿をしっかり して下さい。
経過の診察	治療後1～2週間後（カサブタが脱落した頃）に、治療担当医師の診察をお受け 下さい。
注意事項	<u>ニキビ薬の「ディフェリン®」「ベピオ」「デュアック」「エピデュオ」やトレ チノイン等</u> を使用している方は、治療後2週間使用を中止して下さい。治療後2 週間は、顔剃りを控えて下さい。
料金	◎自費初診料：¥3,300 or 自費再診料：¥1,100 ◎1部位（手のひら2枚分の範囲・3mm以内100個まで）：¥33,000 200個まで：¥55,000 300個まで：¥77,000 ◎麻酔クリーム（1部位）：¥3,300 ○軟膏（顔：ロコイド 首・体：リンデロン）：¥330 ○別途大きなイボがある場合 1個 4mm～5mm以内：¥3,300 1個 6mm～10mm以内：¥5,500 ○別途大きなイボがある場合 局所麻酔注射（1ml毎）：¥1,650

治療効果をご期待に添えない場合や、副作用を発症する可能性があることをご理解いただいた上で治療をお受けください。治療費の返還はできかねますこと、副作用に関わる治療費は患者様ご本人のご負担になりますことをご了承下さい。私は、上記内容及び治療に伴うリスクを含めて理解・確認し、納得した上で多発イボ治療を受けることに同意致します。

年 月 日

自筆サイン _____

保護者(未成年の場合)自筆サイン _____

緊急連絡先(携帯電話など) _____

ミルティス皮フ科(横浜西口) TEL050-3734-5835