

脂漏性角化症 CO₂レーザー同意書

脂漏性角化症をCO₂レーザーでピンポイントに蒸散させる（削る）方法です。

治療が受けられない方	1ヵ月以内に日焼けをした方・妊娠、授乳中の方・皮疹、ヘルペス発疹、皮膚炎がでている方・自己免疫疾患の方・ペースメーカー、埋めこみ式除細動器、金属プレート、金の糸、シリコンが埋め込まれている方・重度の心臓疾患を有する方・糖尿病など創傷治癒に問題がある方・ケロイド体質の方・麻酔薬アレルギーのある方・抗凝固薬・抗血小板薬内服中の方。
治療法	①局所麻酔薬を注射します。 ②炭酸ガスレーザーを使用し腫瘍(できもの)を蒸散(削る)させていきます。 盛り上がっている場合は、メスで切除し、その下床を蒸散させる場合もあります。
ダウンタイム	ハイドロコロイド(テープ)を傷口に使用します。医師の指示があるまで使用の継続をして下さい。ハイドロコロイドは、血液や浸出液でゲル化して皮膚の上皮化を促します。ゲル化したハイドロコロイド材が漏れる前に貼り替えをして下さい。最長でも5日目には貼り替えをしてください。(毎日、貼り替えをする必要はありません)貼り替える際は、ハイドロコロイドテープを剥がし、軽く洗浄した後新しいテープを使用して下さい。
治療後の経過	
写真	経過観察を目的にカルテ写真をお取りさせていただきます。
洗顔・メイク	洗顔・入浴・メイクはハイドロコロイドを貼ったまま行って下さい。治療していない部位は通常通りのスキンケア・メイクが可能です。
アフターケア	治療した部位は過敏な状態となりますので、紫外線に直接さらすと色素沈着を起こしやすくなります。SPF20以上の日焼け止めを使用して下さい。治療後は保湿をしっかりして下さい。
経過の診察	治療後1~2週間後に、治療担当医師の診察をお受け下さい。
注意事項	麻酔薬アレルギーの既往・抗凝固薬・抗血小板薬を内服中の方は事前にお申し出下さい。
料金	◎自費初診料 : ¥3,300 or 再診料 : ¥1,100 ◎0.5cm以下 1個 : ¥3,300 ◎1.0cm以下 1個 : ¥5,500 ◎局所麻酔 1mlまで : ¥1,650 ◎ハイドロコロイドテープ : ¥275

治療効果がご期待に添えない場合や、副作用を発症する可能性があることをご理解いただいた上で治療をお受けください。治療費の返還はできかねますこと、副作用に関わる治療費は患者様ご本人のご負担になりますことをご了承下さい。私は、上記内容及び治療に伴うリスクを含めて理解・確認し、納得した上で脂漏性角化症治療を受けることに同意致します。

年 月 日

自筆サイン _____

保護者(未成年の場合)自筆サイン _____

緊急連絡先(携帯電話など) _____

ミルディス皮膚科(横浜西口) TEL050-3734-5835